

5. Utilize o Algoritmo de Euclides para determinar inteiros x e y tais que $(56, 72) = 56x + 72y$.

6. (a) Mostre que 496 é um número perfeito.

(b) Mostre que o produto de dois primos ímpares nunca é um número perfeito.

Resolução:

Sejam p, q primos ímpares com $p < q$. Note que $p > 2$ e que $1 + p < q$. Tem-se

$$\sigma(pq) = 1 + p + q + pq < 2q + pq < 2pq$$

logo pq não pode ser perfeito.

7. (a) Mostre que se f e g são funções multiplicativas (não identicamente nulas) e $f(p^k) = g(p^k)$ para todos os primos p e todos os inteiros positivos k , então $f = g$.

Resolução:

Para $n = p_1^{k_1} \cdots p_r^{k_r}$ tem-se

$$f(n) = f(p_1^{k_1}) \cdots f(p_r^{k_r}) = g(p_1^{k_1}) \cdots g(p_r^{k_r}) = g(n).$$

(b) Mostre que se tem, para todos os inteiros positivos n ,

$$\sum_{d|n} \frac{1}{d} = \frac{\sigma(n)}{n}.$$

Resolução:

Pela alínea anterior, basta notar que $n \mapsto \sum_{d|n} \frac{1}{d}$ e $n \mapsto \frac{\sigma(n)}{n}$ são multiplicativas, o que é simples, e confirmar a igualdade nas potências dos primos.

Temos

$$\sum_{d|p^k} \frac{1}{d} = \frac{1}{1} + \frac{1}{p} + \cdots + \frac{1}{p^k}$$

e

$$\frac{\sigma(p^k)}{p^k} = \frac{1 + p + \cdots + p^k}{p^k}$$

que são iguais.

8. Relembre que, para $n = p_1^{k_1} \cdots p_r^{k_r}$, se f é multiplicativa, então

$$\sum_{d|n} \mu(d)f(d) = \prod_{i=1}^r (1 - f(p_i)).$$

Mostre que se tem, para qualquer inteiro positivo n ,

$$\sum_{d|n} \mu(d)\sigma(d) = (-1)^r p_1 \cdots p_r.$$

Resolução:

Usando a sugestão basta notar que se tem

$$\prod_{i=1}^r (1 - \sigma(p_i)) = \prod_{i=1}^r (1 - (1 + p_i)) = \prod_{i=1}^r (-p_i) = (-1)^r p_1 \cdots p_r.$$